

# Czynniki predysponujące


ANNA WYZGAŁ-CHOJECKA, MAGDALENA PŁYWACZEWSKA

## KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ

Do ŻChZZ predysponuje wiele czynników nabytych i genetycznych.

U podstaw patofizjologii zaburzeń krzepnięcia, w przebiegu których dochodzi do powstania zakrzepicy, leży triada Virchowa (ryc. 1):

- uszkodzenie ściany naczynia, np. zabieg operacyjny, naciek zapalny, naciek nowotworowy, kaniulacja żyły i inne urazy
- upośledzenie przepływu krwi, np. wskutek unieruchomienia kończyny, ucisku żyły od zewnątrz (np. przez guz, tętniaka, torbiel), ciąży, utrudnionego przepływu (np. z powodu resztkowej skrzepiny po wcześniejszej zakrzepicy, cewnika), otyłości, zastoinowej niewydolności serca, żylaków
- zmiany w składzie krwi, np. wskutek odwodnienia, poliglobulii, hiperfibrynogenemii, trombofilii dziedzicznej, przeciwciał antyfosfolipidowych, antykoagulantu toczniowego, małopłytkowości wywołanej heparyną, aktywatorów krzepnięcia wytwarzanych przez komórki nowotworowe, zmian wywołanych ciążą i położeniem oraz przyjmowania leków.



Rycina 1. Triada Virchowa